

## La thrombose veineuse profonde (TVP)

La méthode des 4 points avec une sonde linéaire permet un diagnostic rapide

10 fois/an<sup>1</sup>

Nombre moyen de suspicions de TVP pour un médecin généraliste


>95%<sup>2</sup>

Spécificité et sensibilité de l'examen

### La méthode des 4 points


De façon bilatérale, on pose la sonde sur la veine fémorale et on exerce une pression jusqu'à collaber la veine à l'image. On réalise la même manipulation au niveau du creux popilté.

### ► RÉSULTATS



#### Conduite à tenir :

Abstention de l'anti-coagulation  
Poursuite des examens cliniques  
Score de Wells et D-Dimères



#### Conduite à tenir :

Anticoagulation du patient  
Redirection vers un spécialiste

1. Delphine Douillet, Gauthier Pierre, François Morin, Thomas Moumneh, Pierre-Marie Roy-La Revue du praticien Médecine générale - Publié le 29 Juin 2021. 35(1058):281-4

Meta-analysis : The value of clinical assessment in the diagnosis of deep venous thrombosis. Ann Intern Med. 2005 Jul 19;143(2):129-39.

2. Pomero F1, Dentali F, Borretta V, Bonzini M, Melchio R, Douketis JD, Accuracy of emergency physician-performed ultrasonography in the diagnosis of deep-vein thrombosis: a systematic review and meta-analysis. Thromb Haemost. 2013 Jan;109(1):137-45.